

CADERNO DE QUESTÕES MÉDICO EMERGENCISTA


INSTRUÇÕES

P
R
O
V
A

A
M
A
R
E
L
A

- 1- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- 2- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.
- 6- Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua prova, ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: 
- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 9- Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso o candidato queira levar o caderno de questões será permitido somente no decorrer dos últimos 15 (quinze) minutos determinados para o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. Os candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar o mesmo sanitário que os candidatos que ainda estão realizando as provas.
- 11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento.
- 12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O texto deverá ser utilizado para responder as questões 01 e 02.

A equipe da USA é acionada para apoio a equipe da USB que está atendendo um paciente de 56 anos, vítima de Morte Súbita. A equipe da USB chegou até o paciente em 03 minutos e a USA em 08 minutos. O médico entrevistou e estabeleceu uma via aérea avançada.

Questão 01

De acordo com as Diretrizes da Associação Americana de Cardiologia(AHA), publicadas em 2005, qual seria o dispositivo recomendado para esse procedimento?

- (A) Cânula Nasofaríngea.
- (B) Cânula de Guedel.
- (C) Máscara Laríngea.
- (D) Cânula Orotraqueal.
- (E) Cânula de Traqueotomia.

Questão 02

Após ventilar adequadamente o paciente, o médico decide aplicar outro dispositivo para proteger a via aérea do paciente. Foi visualizada a passagem do dispositivo pelas cordas vocais e realizada a confirmação primária: não há gorgolejos em epigástrico, o murmúrio vesicular e a expansão torácica estão simétricos e bilaterais. O uso de um dispositivo auxiliar, tal como um detector de CO₂ exalado ou detector esofágico

- (A) não se faz necessário, uma vez que a ventilação com pressão positiva expande os pulmões sem dificuldade.
- (B) somente será necessário se o paciente for mobilizado.
- (C) deve sempre ser utilizado.
- (D) só será utilizado se houver a necessidade de reposicionamento do dispositivo da via aérea avançada.
- (E) não se faz necessário, pois a visualização das cordas vocais confirma o correto posicionamento do dispositivo.

Questão 03

Paciente encontra-se em Parada Cardio-respiratória, com via aérea avançada(tubo endotraqueal). Foram aplicadas as pás do DEA ao tórax do paciente e o mesmo dá a mensagem "choque não indicado". Qual o procedimento indicado?

- (A) reanalisar o ritmo cardíaco.
- (B) realizar 05 ciclos ou dois minutos de RCP.
- (C) desfibrilar com um choque e imediatamente após realizar 05 ciclos ou 02 minutos de RCP.
- (D) desfibrilar com três choques em sequência e reanalisar o ritmo cardíaco.
- (E) realizar 05 ciclos ou 02 minutos de RCP, alternando compressões torácicas e ventilações e reanalisar o ritmo cardíaco.

Questão 04

Numa colisão frontal, o condutor do veículo não estava utilizando o cinto de segurança. O mesmo poderá apresentar as seguintes lesões, EXCETO.

- (A) Pneumotórax Aberto.
- (B) Pneumotórax Fechado.
- (C) Laceração Hepática.
- (D) Fratura de Crânio.
- (E) Ruptura do Diafragma.

Questão 05

Assinale a alternativa INCORRETA, no que diz respeito à manutenção das vias aéreas e da ventilação no trauma.

- (A) Durante todas as manobras de abordagem das vias aéreas, a coluna cervical deve ser protegida por imobilização em posição de alinhamento.
- (B) Quando houver qualquer dúvida quanto à integridade das vias aéreas, deverá ser adotada uma via aérea definitiva.
- (C) A via aérea definitiva deve ser realizada após boa ventilação do paciente, evitando-se períodos prolongados de apneia.
- (D) A intubação nasotraqueal às cegas pode ser realizada em qualquer tipo de trauma, levando-se em conta a experiência e a habilidade do médico.
- (E) O acesso cirúrgico é feito sempre que as manobras de intubação forem infrutíferas.

Questão 06

Em relação ao uso de drogas vasopressoras na Parada Cardíaca, é correto afirmar, EXCETO.

- (A) são administradas preferencialmente após o estabelecimento de uma via de acesso Intra-Venosa ou Intra-Óssea.
- (B) a vasopressina é a droga de primeira escolha.
- (C) a epinefrina pode ser utilizada a cada 3 a 5 minutos.
- (D) são utilizadas após o primeiro ou segundo choque.
- (E) a vasopressina pode substituir a primeira ou a segunda dose da epinefrina.

Questão 07

Paciente de 25 anos, vítima de agressão por arma branca em hipocôndrio direito, apresentado-se ansioso, com sudorese, palidez cutânea, pele fria, taquicardia(115 bpm) e pressão arterial normal. Diante desse quadro, assinale a alternativa correta.

- (A) O volume de perda sanguínea desse paciente é maior do que 750 ml.
- (B) A reposição volêmica inicial deverá ser feita com cristalóide, utilizando-se de 1 a 2 litros de Ringer Lactato.
- (C) O débito urinário medido por sonda vesical deve ser de 1 ml/kg/hora.
- (D) O acesso vascular preferencial nesse paciente deve ser o central(veia subclávia).
- (E) Devido à ansiedade, não há indicação de suplementação de oxigênio por máscara.

Questão 08

Assinale a alternativa correta. A equipe da USA é deslocada pelo Médico Regulador até um ringue de luta de Vale Tudo, por solicitação de um médico que estava prestando assistência aos lutadores. A informação inicial é de que um lutador está com dispnéia importante após sofrer um golpe(joelhada) em hemitórax esquerdo, sem melhora com o uso de suplementação de oxigênio por máscara não-reinalante. Na chegada, ao exame clínico, o paciente queixa dor torácica intensa, com dispnéia significativa, distensão das veias jugulares e cianose labial. Na ausculta respiratória, o murmúrio vesicular está ausente à esquerda. Diante do exposto, é correto afirmar que o paciente apresenta

- (A) um Pneumotórax Hipertensivo e necessita de descompressão imediata através de uma Toracocentese.
- (B) um Pneumotórax Aberto e necessita de toracostomia de urgência.
- (C) um Tamponamento Cardíaco e necessita uma Pericardiocentese.
- (D) um Tórax Instável e necessita de Analgesia para melhorar a ventilação.
- (E) um Hemotórax Maciço e necessita toracostomia com auto-transfusão.

Questão 09

O médico da USA chega na cena de um atropelamento. Vítima do sexo feminino, 30 anos, apresentando-se confusa e repetitiva. Ao aferir a pressão arterial, está em 60 mmHg de sistólica(diastólica não-palpável). Abdome apresenta-se tenso, distendido e com dor à palpação superficial. Diante desse quadro, é correto afirmar, EXCETO.

- (A) A dor abdominal não é um sintoma evidente no trauma de abdome e não deve ser valorizado.
- (B) Deve ser descartada a possibilidade de gravidez.
- (C) Essa vítima deverá ser rolada rapidamente sobre a prancha longa, imobilizada e rapidamente transportada a um Centro de Trauma para receber o tratamento definitivo.
- (D) Realizar acesso venoso e realizar reposição volêmica retarda o tratamento cirúrgico e o controle da hemorragia.
- (E) É necessário abrir as vias aéreas e garantir uma boa ventilação.

Questão 10

Assinale a alternativa correta. Em relação ao Trauma Cranioencefálico(TCE), é correto afirmar que

- (A) os hematomas extra-durais ocorrem por ruptura de uma veia entre a córtex cerebral e o seio venoso para onde ela drena.
- (B) a pupila dilatada unilateralmente pode significar compressão do III par craniano(nervo oculomotor), secundária a herniação tentorial.
- (C) todo paciente com TCE deve ser intubado, devido ao risco de vômito e bronco-aspiração.
- (D) a hipertensão, bradicardia e diminuição da frequência respiratória, traduz aumento importante da pressão intra-craniana e é chamada de Tríade de Beck.
- (E) todo paciente com TCE, e que tenha um escore da Escala de Coma de Glasgow menor ou igual a 9, deve receber oxigênio, 10 a 12 L/min, por meio de máscara facial não-reinalante, com reservatório de oxigênio, preferencialmente.

Questão 11

Na reposição volêmica inicial para um paciente queimado grave, utilizando-se a Regra de Parkland: $\text{Volume} = 2 \text{ a } 4 \text{ ml} \times \text{Peso Corporal(kg)} \times \% \text{ SCQ}$ de 2 e 3 graus, onde SCQ: superfície corporal queimada, para uma vítima do sexo feminino, pesando 84 kg, com 30% de SCQ, o volume total de Ringer Lactato a ser infundido nas primeiras 24 horas será de

- (A) 2520 a 3500 ml nas primeiras 08 horas.
- (B) 3500 a 5040 ml nas primeiras 08 horas.
- (C) 2520 a 5040 ml nas primeiras 08 horas.
- (D) 2520 ml nas 16 horas restantes.
- (E) 5040 ml nas 16 horas restantes.

Questão 12

A equipe da USA é acionada para atender uma mulher de 65 anos, em um Centro Comercial, que tropeçou e caiu na escada. Na avaliação inicial, as suas queixas são de cefaleia intensa, dormência em membro superior e inferior esquerdo, com dificuldade de elevá-lo, embora o direito não apresente essa dificuldade. Ao ser questionada pelo médico da USA se toma medicamentos, responde que tem "pressão alta". É correto afirmar que

- (A) essa paciente apresenta um quadro de demência, provavelmente pela idade avançada, o que justifica que movimenta um lado do corpo e o outro não.
- (B) devido ao quadro provável de demência, é importante que o médico da USA solicite ao Médico Regulador da Central de Regulação, que faça contato com o médico assistente da paciente para que o mesmo determine onde será atendida.
- (C) pela Escala Pré-Hospitalar para AVC de Cincinnati, a debilidade do membro superior esquerdo traduz uma probabilidade de Acidente Vascular Cerebral(AVC) de 72%.
- (D) pela Escala Pré-Hospitalar para AVC de Cincinnati, a alteração somente da movimentação dos braços, sem a presença de queda facial e fala anormal, afasta a possibilidade de AVC.
- (E) não é necessário rapidez no encaminhamento dessa paciente a um Centro de Referência para receber terapia específica, uma vez que essa só é indicada quando o início dos sintomas for superior a 3(três) horas.

Questão 13

No Acidente Vascular Cerebral Agudo, quando houver associação com Hipertensão Arterial, é correto afirmar que, EXCETO.

- (A) A PA elevada após um AVC não constitui uma emergência hipertensiva.
- (B) Assim que a dor, a agitação, o vômito e o aumento da pressão intracraniana(PIC) forem controlados, a PA cairá espontaneamente.
- (C) O Labetalol é o agente anti-hipertensivo preferido, pela sua fácil titulação.
- (D) A Nifedipina sub-lingual não deve ser utilizada, pois pode produzir queda abrupta da PA com piora de um AVC isquêmico.
- (E) A Hipertensão Arterial(PA elevada) deve ser tratada rotineiramente em pacientes com AVC isquêmico agudo.

Questão 14

No paciente que apresenta um Infarto Agudo do Miocárdio Com Elevação do Segmento ST, qual a droga que pode ser utilizada como uma terapia adjuvante?

- (A) Heparina
- (B) Amiodarona
- (C) Epinefrina
- (D) Aspirina
- (E) Morfina

Questão 15

A equipe da USA é chamada para atender um paciente de 60 anos, que se queixa de dor no peito, tonturas e apresenta sudorese. No exame clínico, seu pulso é rápido. Repentinamente, o paciente cai inconsciente. Qual das patologias cardíacas abaixo melhor representa essa condição clínica?

- (A) Taquicardia com função cardiovascular adequada.
- (B) Taquicardia estável.
- (C) Taquicardia instável, com possível parada cardíaca.
- (D) Frequência Cardíaca apropriada para a condição clínica.
- (E) Síndrome de Wolf-Parkinson-White.

Questão 16

As lesões de extremidades, geralmente não se constituem em urgências, não necessitando atenção na avaliação inicial do paciente traumatizado, com EXCEÇÃO da seguinte situação:

- (A) ferimento corto-contuso em terço médio do antebraço sem sangramento externo.
- (B) fratura fechada de tíbia e fíbula.
- (C) fratura fechada do fêmur.
- (D) fratura fechada da clavícula.
- (E) fratura aberta da tíbia com sangramento devido à lesão da artéria tibial anterior.

Questão 17

O volume sanguíneo circulante aumenta significativamente no final da gestação(em torno de 50%). Qual a consequência direta dessa hipervolemia?

- (A) Os sinais e sintomas do choque hipovolêmico geralmente demoram a se manifestar, mesmo quando há perdas significativas de volume(20 a 30%)
- (B) O feto encontra-se protegido dos efeitos do choque hipovolêmico.
- (C) A reposição volêmica deve sempre ser protelada até que surjam os sinais de choque hipovolêmico.
- (D) Após a hemorragia, a reposição de volume deve ser realizada lenta e parcimoniosamente, devido ao risco de edema pulmonar.
- (E) A perfusão placentária é aumentada preferencialmente até que se estabeleça a hipotensão.

Questão 18

Assinale a alternativa correta. Paciente de 56 anos, com antecedentes de etilismo crônico e várias internações por hematemese. Na chegada a residência do paciente, o mesmo está vomitando sangue em abundância, de cor vermelho rutilante. Esse sangramento pode ser devido à

- (A) Síndrome de Mallory-Weiss e úlcera gástrica.
- (B) Gastrite e varizes esofagianas.
- (C) Úlcera gástrica.
- (D) Varizes esofagianas e Síndrome de Mallory-Weiss.
- (E) Síndrome de Mallory-Weiss, Gastrite, Úlcera gástrica e varizes esofagianas.

Analise a situação abaixo para responder as questões 19, 20 e 21.

Paciente de 35 anos, vítima de colisão automobilística, auto x anteparo. A velocidade do carro era de 60 km/h e o peso do paciente de 90 kg. Na chegada da equipe ao local, o mesmo apresenta-se dispneico, agitado e com cianose labial. Ao ser questionado, relata que não estava utilizando o cinto de segurança. Na inspeção visual do interior do veículo, observa-se deformidade no volante. Na inspeção do tórax, há tatuagem do volante em hemitórax esquerdo, com movimentos paradoxais desse lado. Na ausculta respiratória, o murmúrio vesicular encontra-se acentuadamente diminuído à esquerda.

Questão 19

Analisando a fórmula da energia cinética(abaixo), qual seria o fator mais importante na produção das lesões do paciente?

$$E_c = \frac{m \times V^2}{2}$$

onde: m = peso do paciente;
V= velocidade do veículo

- (A) O peso do paciente.
- (B) O tempo resposta da equipe do atendimento pré-hospitalar.
- (C) A velocidade do veículo.
- (D) O tipo de anteparo com o qual o carro colidiu.
- (E) A distância de frenagem do veículo.

Questão 20

A análise da cena, do tipo de acidente, do uso do cinto de segurança e a deformidade do volante, bem como as lesões apresentadas pela vítima, fazem parte de um processo chamado de

- (A) Abordagem Inicial ou Avaliação Primária do Trauma.
- (B) Cinemática do Trauma ou Mecanismo de Lesão.
- (C) Exame Segmentar ou Avaliação Secundária do Trauma.
- (D) Escala de Coma de Glasgow.
- (E) Escala de Trauma Modificada.

Questão 21

O problema clínico do paciente, o procedimento necessário e a localização anatômica onde o mesmo será realizado são, RESPECTIVAMENTE:

- (A) Hemotórax – Toracostomia – 5º espaço intercostal esquerdo, na linha axilar média.
- (B) Pneumotórax Hipertensivo – Toracocentese – 5º espaço intercostal esquerdo, na linha axilar média.
- (C) Hemotórax – Toracostomia – 2º espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular.
- (D) Pneumotórax Hipertensivo – Toracocentese – 2º espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular.
- (E) Pneumotórax Aberto – Curativo de Três Pontas – sobre o local dos movimentos paradoxais.

Questão 22

Assinale a alternativa correta. Ao assumir o seu turno de plantão, o médico é deslocado com a sua equipe em uma Unidade de Suporte Avançado de Vida (USA), atendendo à solicitação da Unidade de Suporte Básico de Vida(USB), que já se encontra no local da ocorrência. Ao chegar ao local, deparam-se com uma colisão frontal envolvendo dois veículos, sendo que a equipe da USB está realizando a retirada rápida de um dos condutores e acena para a equipe da USA que aborde essa vítima. Na abordagem, a vítima apresenta-se inconsciente, com respiração ruidosa, com epistaxe significativa. Dentro dos conceitos de urgência definidos no Manual de Regulação Médica das Urgências, do Ministério da Saúde, essa situação caracteriza-se em uma

- (A) Urgência Nível 1.
- (B) Urgência Nível 2.
- (C) Urgência Nível 3.
- (D) Urgência Nível 4.
- (E) Emergência.

Questão 23

A USA, segundo a Portaria GM n.o 2048, de 05 de novembro de 2002, é classificada como um veículo

- (A) do Tipo A.
- (B) do Tipo B.
- (C) do Tipo C.
- (D) do Tipo D.
- (E) do Tipo E.

Questão 24

A USA é tripulada pelos seguintes profissionais:

- (A) um Motorista, um Médico e um Auxiliar ou Técnico de Enfermagem.
- (B) um Motorista, um Médico e um Enfermeiro.
- (C) um Motorista e um Médico.
- (D) um Motorista e um Enfermeiro.
- (E) um Motorista, um Enfermeiro e um Auxiliar ou Técnico de Enfermagem.

Questão 25

São atribuições Técnicas da Regulação Médica, EXCETO.

- (A) julgar e decidir sobre a gravidade de um caso que lhe está sendo comunicado por rádio ou telefone, estabelecendo uma gravidade presumida.
- (B) enviar os recursos necessários ao atendimento, considerando necessidades e ofertas disponíveis.
- (C) monitorar e orientar o atendimento feito por outro profissional de saúde habilitado (médico intervencionista, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem), por profissional da área de segurança ou bombeiro militar (no limite das competências desses profissionais) ou ainda por leigo que se encontre no local da situação de urgência.
- (D) definir e acionar o serviço de destino do paciente, informando-o sobre as condições e previsão de chegada do mesmo, sugerindo os meios necessários ao seu acolhimento.
- (E) decidir sobre o destino hospitalar ou ambulatorial dos pacientes atendidos no pré-hospitalar.

POLÍTICAS DE SAÚDE**Questão 26**

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), não poderá organizar-se em distritos, tendo em vista a impossibilidade de integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para as ações de saúde.
- (C) Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.
- (D) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- (E) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

Questão 27

Assinale a alternativa correta. À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete participar na formulação e na implementação das políticas de

- (A) controle das agressões ao meio ambiente.
- (B) redes integradas de assistência de alta complexidade.
- (C) rede de laboratórios de saúde pública.
- (D) vigilância epidemiológica.
- (E) vigilância sanitária.

Questão 28

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (C) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.
- (D) Não é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
- (E) É obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados.

Questão 29

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como

- I. despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II. investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 30

Assinale a alternativa correta. O órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo, denomina-se

- (A) Conselho de Saúde.
(B) Conferência de Saúde.
(C) Fundo de Saúde.
(D) Plano de Saúde.
(E) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

Questão 31

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos são

- I. implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- II. contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- III. reduzir a mortalidade materna, tendo em vista que a mortalidade infantil neonatal está controlada.
- IV. fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.

- (D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 32

Assinale a alternativa correta. A Portaria nº 399/2006 do Ministério da Saúde, buscando aprofundar o processo de descentralização, com ênfase numa descentralização compartilhada, fixou a seguinte premissa, que deve orientar este processo:

- (A) cabe à Secretaria de Saúde a proposição de políticas, participação no co-financiamento, cooperação técnica, avaliação, regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos.
(B) concentração dos processos administrativos relativos à gestão para as Comissões Intergestores Bipartite.
(C) as Comissões Intergestores Bipartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intraestaduais e a definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite.
(D) as deliberações das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite devem ser por um terço de seus membros.
(E) a Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da Saúde promoverão e apoiarão processo de qualificação provisório para as Comissões Intergestores Bipartite.

Questão 33

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal

- I. organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro e fora do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
- II. incluir a proposta de organização da Atenção Básica e da forma de utilização dos recursos do PAB fixo e variável, nos Planos de Saúde municipais e do Distrito Federal.
- III. inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando a organização sistêmica da atenção à saúde.
- IV. organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas II, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 34

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O Plano Diretor de Regionalização garante o acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas

- I. acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência.
- II. tratamento clínico e cirúrgico de casos de grandes urgências ambulatoriais.
- III. tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais frequentes.
- IV. controle das doenças bucais mais comuns.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 35

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O SUS institui uma política pública de saúde que visa à integralidade, à universalidade, à busca da equidade e à incorporação de novas tecnologias, saberes e práticas. Apesar dos avanços acumulados no que se refere aos seus princípios norteadores e à descentralização da atenção e da gestão, o SUS atualmente ainda enfrenta uma série de problemas, destacando-se

- I. a fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os diferentes Profissionais.
- II. a fragmentação da rede assistencial dificultando a complementaridade entre a rede básica e o sistema de referência.
- III. a precária interação nas equipes e despreparo para lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de atenção.
- IV. um Sistema Público de Saúde burocratizado e horizontal.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 36

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Para fins de delineamento do campo de conceituação da gestão participativa, suas práticas e mecanismos podem ser agrupados de acordo com as instituições, atores e segmentos sociais envolvidos nos seguintes tipos

- I. mecanismos institucionalizados de controle social.
- II. processos participativos de gestão.

III. instâncias de pactuação entre gestores.

IV. mecanismos de mobilização social.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 37

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre

- I. sua regulamentação.
- II. fiscalização.
- III. controle.
- IV. sua execução devendo ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 38

Assinale a alternativa correta. De acordo com a Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado, com recursos do orçamento

- (A) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
(B) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(C) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(D) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
(E) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Questão 39

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)

- I. a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- II. a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- III. a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- IV. a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 40

O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, denomina-se

- (A) vigilância sanitária.
- (B) vigilância monitorada.
- (C) vigilância intra-sanitária.
- (D) vigilância epidemiológica.
- (E) vigilância do trabalhador.

PORTUGUÊS

Lactantes não devem ser vacinadas contra febre amarela, diz ministério

Imunização deve ser adiada até bebê completar 6 meses.

Duas crianças ficaram doentes após mãe receber dose.

Nova recomendação do Ministério da Saúde orienta mulheres que estão amamentando a adiar a vacinação contra a febre amarela até a criança completar seis meses. De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus atenuado da doença, usado na fabricação do imunizante.

Caso não seja possível adiar, o ministério recomenda que as mães retirem o próprio leite antes da imunização e o congelem para uso durante os 14 dias subsequentes à vacina, quando o vírus atenuado ainda pode estar presente no alimento. Outra alternativa é recorrer a bancos públicos de leite materno.

As informações são da repórter Fabiane Leite e do repórter Carlos Lordelo, do jornal "O Estado de S. Paulo".

As alterações nas orientações para quem está amamentando ocorreram em razão de o Brasil ter registrado, pela primeira vez na história, dois casos em que mães vacinadas contra a doença transmitiram às crianças, por meio do aleitamento, o vírus atenuado.

Os dois bebês, que apresentaram problemas neurológicos, no momento estão bem, mas seguem sob acompanhamento. Os casos ocorreram em Porto Alegre e Cachoeira do Sul, a 196 quilômetros da capital gaúcha.

Atualmente existe recomendação para a vacina na maior parte do País, em razão de o vírus causador da doença ter se difundido entre 2008 e o ano passado no Sudeste, Sul e Centro-Oeste do País. Um total de 51 casos da doença foram registrados no período, com 21 mortes, e 22,4 milhões de vacinas foram distribuídas.

Desde 2007, 112 casos de reações adversas ao imunizante, como as que ocorreram com as crianças, já foram computados pelo ministério. A vacina é fabricada desde o fim dos anos 30 pelo laboratório público Biomanguinhos, da Fiocruz.

Texto adaptado de <

<http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1501870-5603.00-LACTANTES+NAO+DEVEM+SER+VACINADAS+CONTRA+FEBRE+AMARELA+DIZ+MINISTERIO.html>>. Acesso em 22 fev 2010.

Questão 41

Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo do texto.

- (A) Crianças terão de ficar sem a vacina contra a febre amarela.

- (B) Mulheres não poderão ser vacinadas durante a gestação.
- (C) 114 bebês morreram em decorrência da febre amarela.
- (D) O vírus fica no leite materno durante 14 dias após a vacinação.
- (E) O leite materno é o responsável pela contaminação da vacina.

Questão 42

Todas as alternativas a seguir apresentam expressões que retomam outras expressões mencionadas anteriormente no texto, EXCETO

- (A) "...ocorreram em razão de o Brasil ter registrado, pela primeira vez na história..."
- (B) "De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus..."
- (C) "...há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus atenuado da doença..."
- (D) "...há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus atenuado da doença..."
- (E) "...e o congelem para uso durante os 14 dias subsequentes à vacina..."

Questão 43

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) A forma verbal seguem apresenta dois dígrafos
- (B) O nome recomendação apresenta um dígrafo e um ditongo.
- (C) O nome cachoeira apresenta um encontro consonantal e um ditongo.
- (D) O nome quilômetros apresenta dois dígrafos.
- (E) A forma verbal ocorreram apresenta dois dígrafos.

Questão 44

Assinale a alternativa que NÃO apresenta a função sintática correta da expressão em destaque.

- (A) "Duas crianças ficaram doentes após mãe receber dose." (predicativo do sujeito)
- (B) "...dois casos em que mães vacinadas contra a doença transmitiram às crianças..." (objeto indireto)
- (C) "Atualmente existe recomendação para a vacina na maior parte do País..." (adjunto adverbial de modo)
- (D) "...e o congelem para uso durante os 14 dias subsequentes à vacina..." (complemento nominal)
- (E) "De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem contaminados..." (adjunto adverbial de conformidade)

Questão 45

Caso não seja possível adiar, o ministério recomenda que as mães retirem o próprio leite antes da imunização...

As orações destacadas classificam-se, respectivamente, como

- (A) subordinada adverbial causal e subordinada adverbial temporal.
- (B) subordinada adverbial concessiva e subordinada adverbial consecutiva.
- (C) subordinada adverbial temporal e subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) subordinada adverbial causal e subordinada adverbial consecutiva.
- (E) subordinada adverbial condicional e subordinada substantiva objetiva direta.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 46

O campeonato mundial de Fórmula 1 se originou com as corridas de “Grandes Prêmios” disputados na Europa, desde antes da Segunda Guerra Mundial. As corridas cessaram durante a guerra e retornaram em 1950, quando foi instituído o campeonato de Fórmula 1, com regularidade anual. Assinale a alternativa correta.

- (A) O autódromo de Interlagos começou a ser construído na década de 1920, com o processo de urbanização da cidade de São Paulo.
- (B) Ayrton Senna se tornou tricampeão mundial no campeonato de Ímola, Itália, em 1º de maio de 1994.
- (C) Maurício Gugelmin venceu o Grande Prêmio do Brasil de 1989, encerrando sua carreira no esporte.
- (D) Felipe Massa, após um acidente automobilístico em 2009, abandonou definitivamente as corridas de Fórmula 1.
- (E) O brasileiro Rubens Barrichello oferece boas expectativas para os campeonatos de 2010 pela Ferrari.

Questão 47

Adepto da teoria biogênica, Louis Pasteur em 1861, através de um experimento, conseguiu demonstrar conclusivamente a impossibilidade da geração espontânea da vida (hipótese tão defendida pelos abiogenistas), ou seja, a origem da vida somente é possível a partir da matéria viva, de um ser vivo pré-existente. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A importância de Louis Pasteur foi enorme para o estudo das origens da vida, um impacto sobre o melhoramento na produção de queijos, cervejas, vinagres e vinhos.
- (B) Louis Pasteur enfatizava a importância de práticas higiênicas como: ferver ou filtrar a água, lavar e armazenar adequadamente os alimentos, evitando a contaminação por bactérias patogênicas.
- (C) As descobertas de Pasteur contribuíram para a evolução da medicina preventiva, dos métodos cirúrgicos (como a prevenção das infecções), das técnicas de obstetrícia, dos métodos de higiene em geral e das indústrias de bebidas fermentadas.
- (D) Louis Pasteur viveu e se utilizou de conceitos exatos e precisos como “metabolismo” ou “processo de geração da vida” (reprodução) que já eram definidos e possuíam resultados concretos no campo da pesquisa embrionária.
- (E) Louis Pasteur concluiu que a fermentação só ocorria na presença de células vivas: a fermentação era uma consequência da vida sem ar.

Questão 48

“Anos de Chumbo” é uma expressão que inicialmente foi aplicada a um fenômeno europeu relacionado à Guerra Fria. No Brasil é denominado “Anos de Chumbo” o período mais repressivo da ditadura militar. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O ano de 1968 foi crucial, pois o governo promulgou o Ato Institucional n.5.
- (B) O período militar, no Brasil, corresponde ao período que vai de 1964 a 1985.
- (C) O Presidente Ernesto Geisel concedeu a anistia política e o retorno dos exilados.
- (D) Durante o período militar o movimento estudantil era reprimido com violência.
- (E) Foi durante o período militar que aconteceu o famoso “milagre econômico”.

Questão 49

O Tratado de Assunção foi assinado em 26 de março de 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai dando origem ao MERCOSUL. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em 1994, foi assinado o Tratado de Ouro Preto como complemento do Tratado de Assunção, com o objetivo de retirar o Chile do grupo do Mercosul.
- (B) O Estado do Paraná desempenha uma posição estratégica em relação aos outros países do Mercosul, uma vez que faz fronteira com os três.
- (C) Dentre os objetivos do Mercosul destacam-se a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos e a liberação de compras no varejo no Paraguai.
- (D) Além do Mercosul, o Brasil faz parte do bloco econômico G-8, que reúne os sete países mais ricos do mundo mais o Brasil.
- (E) Em fevereiro de 2010, em Cancun, México, foi aprovada a criação de um novo bloco que represente os países da América Latina e do Caribe.

Questão 50

Principal produto da economia da região de Ilhéus-Itabuna, o cacau tem seu cultivo na região originado no século XVIII, quando as capitânicas voltaram às mãos do governo. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os alemães, chegados em 1821 na região, começaram o plantio de cacau como cultura rentável.
- (B) As primeiras sementes foram trazidas da Índia, pois o cacau é nativo da região do rio Ganges.
- (C) Na década de 1920 a cidade de Ilhéus desfrutava de uma riqueza invejável conquistada através do cacau.
- (D) A praga da “vassoura-de-bruxa” foi o principal fator para o enfraquecimento da economia baseada no cacau na região de Ilhéus.
- (E) As primeiras sementes foram trazidas por um francês e plantadas na fazenda Cubículo, às margens do rio Pardo.

