

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA
ESTADO DA BAHIA

REF. EDITAL Nº1/2010- CONCURSO PÚBLICO

CADERNO DE QUESTÕES MÉDICO PEDIATRA


INSTRUÇÕES

P
R
O
V
A

A
M
A
R
E
L
A

- 1- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- 2- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.
- 6- Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua prova, ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: 
- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 9- Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso o candidato queira levar o caderno de questões será permitido somente no decorrer dos últimos 15 (quinze) minutos determinados para o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOC (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. Os candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar o mesmo sanitário que os candidatos que ainda estão realizando as provas.
- 11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento.
- 12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 01

Das alternativas abaixo, qual dos adolescentes com atraso puberal necessita ser investigada/o, por não corresponder aos limites de variações normais do surgimento das manifestações puberais?

- (A) Menina de 12 anos sem aparecimento de broto mamário ou menarca.
- (B) Menina de 16 anos sem telarca ou menarca.
- (C) Menino de 13 anos, no II estágio de Tanner, que não apresenta aumento do pênis.
- (D) Menino de 13 anos sem aumento do pênis ou pubarca.
- (E) Menina de 12 anos apresenta menarca.

Questão 02

Assinale a alternativa correta. A uretrocistografia miccional é de grande importância nos pacientes pediátricos que apresentam infecção urinária, principalmente para evidenciar

- (A) Válvula de uretra posterior.
- (B) Agenesia renal.
- (C) Rim policístico.
- (D) Refluxo vésico-urinário.
- (E) Estenose de junção pielocalicial.

Questão 03

O desconforto respiratório de início precoce em RN de termo, parto cesáreo, com APGAR 5-7, deve-se ao que se convencionou chamar de Taquipnéia Transitória do recém-nascido, o tratamento será

- (A) aquecimento e oxigenoterapia.
- (B) cuidados do berçário e vitamina K.
- (C) manter hipotermia e oxigênio.
- (D) pressão positiva, cuidados e vitamina K.
- (E) surfactante pulmonar exógeno.

Questão 04

A cardiopatia congênita acianótica mais frequente na infância é

- (A) Persistência do Canal Arterial (PCA).
- (B) Comunicação Inter ventricular (CIV).
- (C) Comunicação Inter Atrial (CIA).
- (D) Tetralogia de Fallot.
- (E) Coarctação da Aorta.

Questão 05

Uma criança de oito anos de idade apresenta placas pustulosas nas amígdalas, com dor intensa local, bastante hiperemiadas e hipertrofiadas. A mãe refere que a quatro dias a febre alta e a prostração são progressivas. Ao exame o pediatra observa que a pele está avermelhada e a mãe refere que a criança está “cada vez mais vermelha”, além disso informa que a que a tosse também tem piorado. O pediatra mostra para a mãe da criança que existe uma área mais clara em torno da boca contrastando com o eritema generalizado. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico desta doença, sua etiologia e o antibiótico de primeira escolha para o tratamento.

- (A) Amigdalite pultácea, pneumococo e sulfametoxazol.
- (B) Escarlatina, estreptococo e penicilina benzatina.
- (C) Escarlatina, estafilococo e eritromicina.
- (D) Abscesso retroamigdaliano, clamídia e cefalotina.
- (E) Pneumonia, pneumococo e ceftriaxona.

Questão 06

Um menino de 12 anos de idade apresentou, após jogar futebol, durante duas horas, discreto edema em joelho esquerdo e foi medicado pela própria mãe, com uma dose de paracetamol, apresentando melhora. Três dias depois, queixou-se de dor em joelho direito e notou que a área estava “mais quente”. Procurou o serviço médico onde foi receitado uma antiinflamatório não hormonal, por via oral, a ser usado por cinco dias. Passaram-se dois meses e ao ser examinado por um médico generalista para usar a piscina do clube que frequenta, o mesmo auscultou sopro cardíaco, sem comprometimento hemodinâmico. Quais os outros sinais clínicos ou laboratoriais podem ser associados para que possamos afirmar que este paciente desenvolveu Febre Reumática (FR)?

- (A) Quando este quadro é associado ao hemograma com leucocitose podemos afirmar que o diagnóstico é FR.
- (B) Para caracterizar a doença utilizaremos os critérios de Jones, entre os critérios maiores o eletrocardiograma é o mais importante para definir o diagnóstico.
- (C) A FR tem história clínica diferente da relatada, porém, se o paciente apresentar alterações do cálcio e magnésio nos exames laboratoriais, devemos considerar o provável diagnóstico.
- (D) A cardite reumática, associada à alterações de movimento involuntário (coreia) são sinais maiores da doença, auxiliando no diagnóstico.
- (E) a tomografia de crânio e cintigrafia óssea dos membros envolvidos são prioritários para o diagnóstico.

Questão 07

O estado de mal epilético é uma verdadeira emergência médica, que, se não tratada de forma adequada, pode ser fatal ou causar lesões neurológicas graves e permanentes. É definido como a ocorrência de convulsão contínua ou convulsões seriadas sem retorno da consciência entre as crises, com duração superior a 30 minutos. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) pode manifestar-se de qualquer tipo de crise convulsiva, mais comumente uma crise tônico-clônica generalizada.
- (B) os primeiros cuidados ao receber o paciente com crise convulsiva, será manter a via aérea, ofertar oxigênio, instalar oxímetro, acesso venoso, dosar glicemia periférica e combater a hipertermia (se houver).
- (C) a realização de punção lombar é uma prioridade, pois define o tratamento inicial.
- (D) Após os cuidados iniciais, não há necessidade de postergar o início da antibiótico terapia, caso os resultados laboratoriais não mostrarem alterações metabólicas a ser corrigidas.
- (E) Na prática a sequência de drogas anti convulsivantes poderá respeitar a seguinte sequência: nos primeiros 15 minutos da crise convulsiva, o uso de diazepam ou midazolam. Entre 15 e 30 minutos a fenitoina e fenobarbital, porém, após 30 minutos deve ser considerado o uso de barbitúrico com tiopental.

Questão 08

Assinale a alternativa correta. Dois minutos após o parto transpélvico de um recém nascido de termo o mesmo encontra-se respirando com desconforto leve, com frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto, com cianose de extremidades, sem hipotonia, reagindo ao uso da sonda nasal. Após a desobstrução das vias aéreas, a próxima conduta a ser tomada é

- (A) aquecimento e secagem adequada, com oferta de oxigênio sob cateter com 5l/min.
- (B) intubação oro traqueal e ventilação positiva.
- (C) massagem cardíaca externa.
- (D) aplicação de adrenalina EV.
- (E) cateterização de veia umbilical e expansão volumétrica com soro fisiológico.

Questão 09

Uma criança de 6 anos de idade foi atendida no pronto socorro com queixa de febre, tosse e dor torácica há 24 horas. O exame físico mostrou febre de 38,5 °C, FR = 34 bpm, FC = 120 bpm, prostração moderada e à ausculta apresenta diminuição do MV em base do pulmão direito, com sopro tubário. O raio X de tórax evidenciava infiltrado tipo inflamatório em placa em 1/3 inferior do hemitórax direito com borramento do seio costofrênico homolateral. Das alternativas abaixo, qual o esquema antibiótico inicial mais indicado para este paciente?

- (A) penicilina procaína IM (50 000 U/kg/ dia por 7 a 10 dias).
- (B) oxacilina EV (200 mg/kg/dia por 14 dias).
- (C) esquema RIP [rifampicina(20)+isoniazida(10)+pirazinamida(35)] por 6 meses.
- (D) gentamicina IM (5 mg/kg/dia por 10 dias).
- (E) tetraciclina VO (50 mg/kg/dia por 10 dias).

Questão 10

Criança de dois anos de idade apresenta quadro de disenteria e febre, sem desidratação. Assinale a alternativa que contenha os prováveis agentes etiológicos que cursem nesta situação.

- (A) Shigella, Campylobacter.
- (B) Salmonella, E. Coli enterotoxigênica.
- (C) Campylobacter, Rotavírus.
- (D) Shigella, V. Cholerae.
- (E) Rotavírus, Salmonella.

Questão 11

Uma menina de 18 meses de idade apresenta febre há três dias, com poucos pródromos de infecção respiratória aguda, apresenta erupção maculopapular que cursa por dois dias. Foi relatado pela mãe da paciente que “no dia em que apareceu as manchas na pele, a febre desapareceu”. Evolutivamente não houve piora do estado geral da criança. Este é um relato comum em uma das doenças exantemáticas citadas nas alternativas. Qual seu agente etiológico?

- (A) Escarlatina – Streptococcus pyogenes.
- (B) Mononucleose infecciosa – Epstein-Barr Vírus.
- (C) Exantema súbito – Herpes vírus 6.
- (D) Varicela – Varicela Zoster.
- (E) Eritema infeccioso – parvovirus B19.

Questão 12

João Pedro, tem 9 meses de idade e apresenta desidratação moderada por diarreia aguda. Após permanecer por uma hora na Unidade de Saúde para Terapia de Reidratação Oral (TRO), vomitou três vezes. Está sem febre e o estado geral preservado. Nesse caso a conduta mais adequada é

- (A) introduzir sonda nasogástrica e iniciar a TRO por gastróclise.
- (B) suspender a TRO e iniciar terapia intravenosa com soro fisiológico.
- (C) prescrever procinético e manter a administração de TRO.
- (D) prescrever anti-emético e reiniciar TRO após trinta minutos.
- (E) diminuir o volume dado por vez e aumentar a frequência da administração.

Questão 13

Assinale a alternativa correta. Pré-escolar de cinco anos está em investigação diagnóstica de febre de origem indeterminada há três semanas, associada a perda de peso nas últimas semanas sem outras queixas. Há relato de que uma tia da criança teve uma doença de pulmão, que tratou por um ano, período em que morou com a criança. Realizado o PPD = 14mm e radiografia de tórax com imagens micronodulares disseminadas. Ao exame físico: eupnéico, ausculta pulmonar rude, com queixa de tosse eventual. A principal hipótese diagnóstica é

- (A) tuberculose miliar.
- (B) pneumonia atípica.
- (C) histoplasmose pulmonar.
- (D) pneumonia intersticial linfocítica.
- (E) pneumonia por pneumocystis carinii.

Questão 14

Em relação as recomendações atuais de imunizações no Brasil listadas abaixo, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A segunda dose da vacina BCG deve obedecer calendário nacional único, e ser aplicada com dois anos de idade.
- (B) A vacina contra hepatite B, deve ser aplicada nas primeiras 12 horas de vida. Crianças com peso de nascimento igual ou inferior a 2 Kg, devem receber o seguinte esquema vacinal: 1ª dose ao nascer; 2ª dose ao completar 2 Kg; 3ª dose 1 mês após a 2ª dose; 4ª dose, 6 meses após a 2ª dose.
- (C) Vacinas combinadas contemplam a 2ª dose da vacina contra Hepatite B aos 2 meses de vida.
- (D) A vacina DTP (células inteiras) é eficaz e bem tolerada. Quando possível, aplicar a DTPa (acelular) devido a sua menor reatogenicidade.
- (E) Se usada uma vacina combinada Hib / DTPa (tríplice acelular), uma quarta dose da Hib deve ser aplicada aos 15 meses de vida.

Questão 15

Recém-nascido de 25 dias, em aleitamento exclusivo ao seio materno, apresenta icterícia com hiperbilirrubinemia direta e fezes hipocólicas. Assinale a alternativa que apresenta os diagnósticos prováveis para este caso.

- (A) Atresia de vias biliares extra-hepática, Sífilis congênita, Infecção urinária
- (B) Atresia de vias biliares extra-hepática, Síndrome de Gilbert, Infecção urinária.
- (C) Sífilis congênita, Infecção urinária, Síndrome de Crigler-Najjar.
- (D) Atresia de vias biliares intra-hepática, Infecção por Citomegalovírus, Incompatibilidade ABO.
- (E) Síndrome de Gilbert, Incompatibilidade ABO, Atresia de vias biliares extra-hepática

Questão 16

Muitos avanços têm sido feitos no atendimento da criança em Parada Cardio Respiratória (PCR), desde o treinamento de equipes até a uniformização de condutas. Sobre estas condutas podemos afirmar, EXCETO:

- (A) o uso da epinefrina é mais importante na fase aguda da PCR.
- (B) nos pacientes pediátricos a acidemia durante a PCR é predominantemente respiratória do que metabólica.
- (C) quando abordamos um paciente em PCR a primeira atitude será estabelecer a via aérea.
- (D) um diagnóstico importante será a assistolia. Neste caso a desfibrilação elétrica estará indicada.
- (E) Nos recém nascidos a verificação do pulso deve ser feita preferencialmente na artéria braquial.

Questão 17

Ana Paula tem 12 anos apresenta-se com mal-estar, cefaleia, tosse seca, dor de garganta e alguns episódios de febre. Dez dias após este quadro, procura o médico por agravamento da tosse que é persistente, muito intensa, em paroxismos, com escarro mucóide. Ao exame físico, a paciente tem regular estado geral e auscultam-se alguns roncocal nas bases. Foi solicitado um RaioX de tórax que evidencia infiltrado intersticial broncopneumônico bilateral. Qual o agente mais provável para esse quadro é?

- (A) Pseudomonas aeruginosa.
- (B) Streptococcus pneumoniae.
- (C) Staphylococcus aureus.
- (D) Mycoplasma pneumoniae.
- (E) Haemophilus influenzae.

Questão 18

Ainda que nas primeiras semanas de vida, alguns sinais clínicos considerados precoces, podem nos auxiliar no diagnóstico da sífilis congênita primária.

- (A) hepatoesplenomegalia
- (B) eritema maculo papular, com lesões bolhosas palmo plantares
- (C) osteocondrite com dor à manipulação de membros superiores
- (D) Dentes de Hutchinson
- (E) rinite com secreção rica em Treponema pallidum

Questão 19

A tríade da glomérulo nefrite pós estreptocócica é conhecida por

- (A) colestase, edema e plaquetopenia.
- (B) petéquias, plaquetopenia e hematuria.
- (C) hematuria, hipertensão e febre.
- (D) sopro cardíaco, edema e hematuria.
- (E) edema, hipertensão e hematuria.

Questão 20

Assinale a alternativa correta. Um paciente de 9 anos de idade deu entrada na emergência por apresentar febre, prostração intensa, petéquias distribuídas em tronco e membros superiores. Este quadro iniciou-se há 48 horas com pioras nas últimas 3 horas. O médico formula a hipótese diagnóstica de meningococemia, assim sua conduta para evitar uma evolução grave deve ser

- (A) realizar a punção lombar imediata e iniciar antibióticos.
- (B) priorizar a aferição da pressão arterial, pois choque deve ser corrigido com reposições volumétricas, evitando colapso circulatório.
- (C) colher gasometria, hemograma, VHS, sódio, potássio, cálcio e magnésio. Assim que tiver os resultados iniciar terapêutica.
- (D) utilizar antitérmico, tentar obter da família, mais informações sobre a evolução da doença.
- (E) solicitar parecer da hematologia, pois as lesões de pele poderão ser tratadas de modo errôneo, comprometendo a evolução da doença.

Questão 21

Assinale a alternativa correta. As anemias ferroprivas são frequentes em pacientes pediátricos e corriqueiramente tem diagnóstico e tratamento adequado. Quanto à evolução laboratorial destes pacientes em tratamento poderemos afirmar que

- (A) a reposição dos estoques corporais se dá em o primeiro e o terceiro mês de tratamento
- (B) com 48h de tratamento já existe uma hiperplasia eritróide respondendo à reposição de ferro
- (C) o pico da reticulocitose ocorrerá com aproximadamente seis semanas após o início do tratamento
- (D) entre 5 e 30 dias, haverá, gradativamente, aumento nos níveis de hemoglobina
- (E) a reposição das enzimas intra celulares, ocorrem de forma precoce, com apenas 12 a 24h após iniciarmos o sulfato ferroso.

Questão 22

Recém-nascido do sexo feminino apresenta hipotonia, fissuras pálpebras inclinadas para cima, sopro cardíaco, prega palmar única, hipoplasia da falange intermédia do quinto dedo e manchas de Brushfield. O diagnóstico provável é

- (A) Trissomia do 18 - S. Edwards.
- (B) Trissomia do 13 - S. Patau.
- (C) S. Turner.
- (D) Trissomia do 21 - S. Down.
- (E) Mosaicismo.

Questão 23

Um menino de 12 anos é levado à consulta médica com queixa de estar mais baixo que seus colegas de classe na escola. Tinha peso e comprimento considerados normais ao nascer (p50). Nos primeiros meses de vida o seu crescimento foi dentro dos padrões normais, começando a desacelerar entre o segundo e terceiro ano de vida. Com três anos estava abaixo do terceiro percentil, onde se mantém. Atualmente, vem crescendo cinco centímetros por ano. Sua genitália é impúbere, com um atraso da idade óssea. Embora seus pais tenham estatura normal (p50), a cronologia do desenvolvimento foi semelhante. Assim, o diagnóstico mais provável será

- (A) baixa estatura familiar.
- (B) baixa estatura por doença genética.
- (C) atraso constitucional do crescimento.
- (D) deficiência de hormônio do crescimento.
- (E) deficiência de micronutrientes.

Questão 24

Assinale a alternativa correta. Uma menina de seis meses é levada por sua mãe a um pronto-socorro com história de ter caído do berço ao tentar pular por cima da grade de proteção, que era alta. A menina apresentava hematoma em tronco e fratura em metafise proximal da tíbia esquerda. Após o atendimento o profissional deve

- (A) encaminhar para exame de corpo de delito no IML.
- (B) notificar o conselho tutelar.
- (C) alertar sua mãe para que fique mais atenta contra acidentes.
- (D) orientar que sua mãe levante a grade do berço.
- (E) observar a criança em casa.

Questão 25

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta quanto aos estados dependentes de vitaminas

- (A) Hiperkeratose folicular / Riboflavina.
- (B) Hemorragia gengival / Vitamina A.
- (C) Doença de Hartnup / Niacina.
- (D) Deficiência de Piruvatoquinase / Vitamina B12.
- (E) Alterações da visão / vitamina E.

POLÍTICAS DE SAÚDE

Questão 26

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), não poderá organizar-se em distritos, tendo em vista a impossibilidade de integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para as ações de saúde.
- (C) Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.
- (D) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- (E) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos

competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

Questão 27

Assinale a alternativa correta. À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete participar na formulação e na implementação das políticas de

- (A) controle das agressões ao meio ambiente.
- (B) redes integradas de assistência de alta complexidade.
- (C) rede de laboratórios de saúde pública.
- (D) vigilância epidemiológica.
- (E) vigilância sanitária.

Questão 28

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (C) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.
- (D) Não é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
- (E) É obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados.

Questão 29

Analisando as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como

- I. despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II. investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 30

Assinale a alternativa correta. O órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo, denomina-se

- (A) Conselho de Saúde.
- (B) Conferência de Saúde.
- (C) Fundo de Saúde.
- (D) Plano de Saúde.
- (E) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

Questão 31

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos são

- I. implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- II. contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- III. reduzir a mortalidade materna, tendo em vista que a mortalidade infantil neonatal está controlada.
- IV. fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 32

Assinale a alternativa correta. A Portaria nº 399/2006 do Ministério da Saúde, buscando aprofundar o processo de descentralização, com ênfase numa descentralização compartilhada, fixou a seguinte premissa, que deve orientar este processo:

- (A) cabe à Secretaria de Saúde a proposição de políticas, participação no co-financiamento, cooperação técnica, avaliação, regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos.
- (B) concentração dos processos administrativos relativos à gestão para as Comissões Intergestores Bipartite.
- (C) as Comissões Intergestores Bipartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intraestaduais e a definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite.
- (D) as deliberações das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite devem ser por um terço de seus membros.
- (E) a Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da Saúde promoverão e apoiarão processo de qualificação provisório para as Comissões Intergestores Bipartite.

Questão 33

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal

- I. organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro e fora do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
- II. incluir a proposta de organização da Atenção Básica e da forma de utilização dos recursos do PAB fixo e variável, nos Planos de Saúde municipais e do Distrito Federal.
- III. inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando a organização sistêmica da atenção à saúde.
- IV. organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 34

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O Plano Diretor de Regionalização garante o acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas

- I. acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência.
- II. tratamento clínico e cirúrgico de casos de grandes urgências ambulatoriais.
- III. tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais frequentes.
- IV. controle das doenças bucais mais comuns.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 35

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O SUS institui uma política pública de saúde que visa à integralidade, à universalidade, à busca da equidade e à incorporação de novas tecnologias, saberes e práticas. Apesar dos avanços acumulados no que se refere aos seus princípios norteadores e à descentralização da atenção e da gestão, o SUS atualmente ainda enfrenta uma série de problemas, destacando-se

- I. a fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os diferentes Profissionais.
- II. a fragmentação da rede assistencial dificultando a complementaridade entre a rede básica e o sistema de referência.
- III. a precária interação nas equipes e despreparo para lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de atenção.
- IV. um Sistema Público de Saúde burocratizado e horizontal.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 36

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Para fins de delineamento do campo de conceituação da gestão participativa, suas práticas e mecanismos podem ser agrupados de acordo com as instituições, atores e segmentos sociais envolvidos nos seguintes tipos

- I. mecanismos institucionalizados de controle social.
- II. processos participativos de gestão.
- III. instâncias de pactuação entre gestores.
- IV. mecanismos de mobilização social.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 37

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre

- I. sua regulamentação.
- II. fiscalização.
- III. controle.
- IV. sua execução devendo ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 38

Assinale a alternativa correta. De acordo com a Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado, com recursos do orçamento

- (A) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
(B) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(C) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(D) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
(E) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Questão 39

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)

- I. a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- II. a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- III. a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- IV. a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 40

O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, denomina-se

- (A) vigilância sanitária.
(B) vigilância monitorada.
(C) vigilância intra-sanitária.
(D) vigilância epidemiológica.
(E) vigilância do trabalhador.

Lactantes não devem ser vacinadas contra febre amarela, diz ministério

Imunização deve ser adiada até bebê completar 6 meses.

Duas crianças ficaram doentes após mãe receber dose.

Nova recomendação do Ministério da Saúde orienta mulheres que estão amamentando a adiar a vacinação contra a febre amarela até a criança completar seis meses. De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus atenuado da doença, usado na fabricação do imunizante.

Caso não seja possível adiar, o ministério recomenda que as mães retirem o próprio leite antes da imunização e o congelem para uso durante os 14 dias subsequentes à vacina, quando o vírus atenuado ainda pode estar presente no alimento. Outra alternativa é recorrer a bancos públicos de leite materno.

As informações são da repórter Fabiane Leite e do repórter Carlos Lordelo, do jornal "O Estado de S. Paulo".

As alterações nas orientações para quem está amamentando ocorreram em razão de o Brasil ter registrado, pela primeira vez na história, dois casos em que mães vacinadas contra a doença transmitiram às crianças, por meio do aleitamento, o vírus atenuado.

Os dois bebês, que apresentaram problemas neurológicos, no momento estão bem, mas seguem sob acompanhamento. Os casos ocorreram em Porto Alegre e Cachoeira do Sul, a 196 quilômetros da capital gaúcha.

Atualmente existe recomendação para a vacina na maior parte do País, em razão de o vírus causador da doença ter se difundido entre 2008 e o ano passado no Sudeste, Sul e Centro-Oeste do País. Um total de 51 casos da doença foram registrados no período, com 21 mortes, e 22,4 milhões de vacinas foram distribuídas.

Desde 2007, 112 casos de reações adversas ao imunizante, como as que ocorreram com as crianças, já foram computados pelo ministério. A vacina é fabricada desde o fim dos anos 30 pelo laboratório público Biomanguinhos, da Fiocruz.

Texto adaptado de <

<http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1501870-5603,00-LACTANTES+NAO+DEVEM+SER+VACINADAS+CONTRA+FEBRE+AMARELA+DIZ+MINISTERIO.html>>. Acesso em 22 fev 2010.

Questão 41

Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo do texto.

- (A) Crianças terão de ficar sem a vacina contra a febre amarela.
- (B) Mulheres não poderão ser vacinadas durante a gestação.
- (C) 114 bebês morreram em decorrência da febre amarela.
- (D) O vírus fica no leite materno durante 14 dias após a vacinação.
- (E) O leite materno é o responsável pela contaminação da vacina.

Questão 42

Todas as alternativas a seguir apresentam expressões que retomam outras expressões mencionadas anteriormente no texto, EXCETO

- (A) "...ocorreram em razão de o Brasil ter registrado, pela primeira vez na história..."
- (B) "De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus..."
- (C) "...há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus atenuado da doença..."
- (D) "...há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus atenuado da doença..."
- (E) "...e o congelem para uso durante os 14 dias subsequentes à vacina..."

Questão 43

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) A forma verbal seguem apresenta dois dígrafos
- (B) O nome recomendação apresenta um dígrafo e um ditongo.
- (C) O nome cachoeira apresenta um encontro consonantal e um ditongo.
- (D) O nome quilômetros apresenta dois dígrafos.
- (E) A forma verbal ocorreram apresenta dois dígrafos.

Questão 44

Assinale a alternativa que NÃO apresenta a função sintática correta da expressão em destaque.

- (A) "Duas crianças ficaram doentes após mãe receber dose." (predicativo do sujeito)
- (B) "...dois casos em que mães vacinadas contra a doença transmitiram às crianças..." (objeto indireto)
- (C) "Atualmente existe recomendação para a vacina na maior parte do País..." (adjunto adverbial de modo)
- (D) "...e o congelem para uso durante os 14 dias subsequentes à vacina..." (complemento nominal)
- (E) "De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem contaminados..." (adjunto adverbial de conformidade)

Questão 45

"Caso não seja possível adiar, o ministério recomenda que as mães retirem o próprio leite antes da imunização..."

As orações destacadas classificam-se, respectivamente, como

- (A) subordinada adverbial causal e subordinada adverbial temporal.
- (B) subordinada adverbial concessiva e subordinada adverbial consecutiva.
- (C) subordinada adverbial temporal e subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) subordinada adverbial causal e subordinada adverbial consecutiva.
- (E) subordinada adverbial condicional e subordinada substantiva objetiva direta.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 46

O campeonato mundial de Fórmula 1 se originou com as corridas de “Grandes Prêmios” disputados na Europa, desde antes da Segunda Guerra Mundial. As corridas cessaram durante a guerra e retornaram em 1950, quando foi instituído o campeonato de Fórmula 1, com regularidade anual. Assinale a alternativa correta.

- (A) O autódromo de Interlagos começou a ser construído na década de 1920, com o processo de urbanização da cidade de São Paulo.
- (B) Ayrton Senna se tornou tricampeão mundial no campeonato de Ímola, Itália, em 1º de maio de 1994.
- (C) Maurício Gugelmin venceu o Grande Prêmio do Brasil de 1989, encerrando sua carreira no esporte.
- (D) Felipe Massa, após um acidente automobilístico em 2009, abandonou definitivamente as corridas de Fórmula 1.
- (E) O brasileiro Rubens Barrichello oferece boas expectativas para os campeonatos de 2010 pela Ferrari.

Questão 47

Adepto da teoria biogênica, Louis Pasteur em 1861, através de um experimento, conseguiu demonstrar conclusivamente a impossibilidade da geração espontânea da vida (hipótese tão defendida pelos abiogenistas), ou seja, a origem da vida somente é possível a partir da matéria viva, de um ser vivo pré-existente. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A importância de Louis Pasteur foi enorme para o estudo das origens da vida, um impacto sobre o melhoramento na produção de queijos, cervejas, vinagres e vinhos.
- (B) Louis Pasteur enfatizava a importância de práticas higiênicas como: ferver ou filtrar a água, lavar e armazenar adequadamente os alimentos, evitando a contaminação por bactérias patogênicas.
- (C) As descobertas de Pasteur contribuíram para a evolução da medicina preventiva, dos métodos cirúrgicos (como a prevenção das infecções), das técnicas de obstetrícia, dos métodos de higiene em geral e das indústrias de bebidas fermentadas.
- (D) Louis Pasteur viveu e se utilizou de conceitos exatos e precisos como “metabolismo” ou “processo de geração da vida” (reprodução) que já eram definidos e possuíam resultados concretos no campo da pesquisa embrionária.
- (E) Louis Pasteur concluiu que a fermentação só ocorria na presença de células vivas: a fermentação era uma consequência da vida sem ar.

Questão 48

“Anos de Chumbo” é uma expressão que inicialmente foi aplicada a um fenômeno europeu relacionado à Guerra Fria. No Brasil é denominado “Anos de Chumbo” o período mais repressivo da ditadura militar. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O ano de 1968 foi crucial, pois o governo promulgou o Ato Institucional n.5.
- (B) O período militar, no Brasil, corresponde ao período que vai de 1964 a 1985.
- (C) O Presidente Ernesto Geisel concedeu a anistia política e o retorno dos exilados.
- (D) Durante o período militar o movimento estudantil era reprimido com violência.
- (E) Foi durante o período militar que aconteceu o famoso “milagre econômico”.

Questão 49

O Tratado de Assunção foi assinado em 26 de março de 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai dando origem ao MERCOSUL. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em 1994, foi assinado o Tratado de Ouro Preto como complemento do Tratado de Assunção, com o objetivo de retirar o Chile do grupo do Mercosul.
- (B) O Estado do Paraná desempenha uma posição estratégica em relação aos outros países do Mercosul, uma vez que faz fronteira com os três.
- (C) Dentre os objetivos do Mercosul destacam-se a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos e a liberação de compras no varejo no Paraguai.
- (D) Além do Mercosul, o Brasil faz parte do bloco econômico G-8, que reúne os sete países mais ricos do mundo mais o Brasil.
- (E) Em fevereiro de 2010, em Cancun, México, foi aprovada a criação de um novo bloco que represente os países da América Latina e do Caribe.

Questão 50

Principal produto da economia da região de Ilhéus-Itabuna, o cacau tem seu cultivo na região originado no século XVIII, quando as capitânicas voltaram às mãos do governo. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os alemães, chegados em 1821 na região, começaram o plantio de cacau como cultura rentável.
- (B) As primeiras sementes foram trazidas da Índia, pois o cacau é nativo da região do rio Ganges.
- (C) Na década de 1920 a cidade de Ilhéus desfrutava de uma riqueza invejável conquistada através do cacau.
- (D) A praga da “vassoura-de-bruxa” foi o principal fator para o enfraquecimento da economia baseada no cacau na região de Ilhéus.
- (E) As primeiras sementes foram trazidas por um francês e plantadas na fazenda Cubículo, às margens do rio Pardo.

